



**COLDIRETTI
VERONA**

Notiziario ciliegio 2023

Data, 02 GIUGNO 2023

Anno 2023, Numero 12

AIPO OP
SOC. COOP. ARL

CILIEGIE DELLE COLLINE VERONESI

Fase fenologica:

- Bassa collina: raccolta delle varietà precoci, maturazione per le altre con quasi termine della colorazione.
- Media collina: maturazione di tutte le varietà, in conclusione la colorazione.
- Alta collina: le cv precoci sono in fase di invaiatura mentre le cv precoci sono in fase di ingrossamento frutti

Monilia: assenza d'infezioni.

Corineo: rilevata presenza solo in alta collina, in caso di necessità intervenire con Prodotti rameici, o Ziram, o Captano, è possibile integrare la lotta chimica con potature verdi ed eliminazione delle parti infette.

Ricamatori: limitata presenza di Cacecia in 8 punti di monitoraggio sia della bassa che alta collina.



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aiроверona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 – 37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.



**COLDIRETTI
VERONA**

Notiziario ciliegio 2023

Data, 02 GIUGNO 2023

Anno 2023, Numero 12

AIPO^{OP}
SOC. COOP. ARL

CILIEGIE DELLE COLLINE VERONESI

Rodilegno: presenze in bassa, media ed alta collina. Vanno posizionate le trappole ad attrattivo feromonico per la cattura massale e attendere indicazioni per eventuali trattamenti fitosanitari al raggiungimento del picco di catture.

Cimice asiatica: presenze di adulti nelle trappole anche in alta collina, dove sono rilevate le prime punture di suzione su frutti in fase di invaiatura. Si consiglia di pianificare adeguate strategie di difesa contro la cimice asiatica dalla fase fenologica dell'invaiatura.

Cocciniglie Sono presenti infestazioni di *Cocciniglia di San José* in due siti di alta collina con percentuali del 5 e 30%. La soglia di intervento è del 3% di organi infestati o presenza l'anno precedente, eventualmente intervenire con Olio minerale, o Spirotetramat o Pyriproxyfen, attenzione ai tempi di carenza. In caso di forti infestazioni è consigliato inoltre eliminare i rami più colpiti.



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aipoverona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 – 37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.



Notiziario ciliegio 2023

Data, 02 GIUGNO 2023

Anno 2023, Numero 12

AIPO OP
SOC. COOP. ARL

**COLDIRETTI
VERONA**

CILIEGIE DELLE COLLINE VERONESI

Afidi Rilevata la presenza di afide nero in 5 siti di media ed alta collina. Valutare la presenza di predatori e parassitoidi (coccinelle, sirfidi, neurotteri). E' consigliabile l'intervento con insetticidi in aree ad elevato rischio o al superamento del 3% degli organi colpiti con Sali potassici acidi grassi o Pirimicarb, o altri prodotti specifici. Attenzione ai tempi di carenza.

Drosophila suzukii: A tutte le altitudini la presenza di D. suzukii è in crescita. I frutti sono in piena fase di suscettibilità agli attacchi del dittero, si consiglia di mantenere la copertura insetticida fino alla fase di raccolta, rispettando i tempi di carenza utilizzando Piretrine pure, o Acetamiprid, o Deltametrina, o Spinetoram, o Emamectina benzoate.

Mosca della frutta: nessuna presenza.



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aiроверona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 – 37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.