

Fase fenologica: tra fioritura e caduta petali per le varietà medie e tardive, le precocissime sono invece a caduta petali e, per alcune varietà ad allegagione.

Difesa fitosanitaria

Monilia: qualche sintomo d'infezioni dove non si è attuato alcun intervento. In caso di necessità intervenire con *Bacillus subtilis*; *Bacillus amyloliquefaciens*; Polisolfuro di calcio; Bicarbonato di potassio.

Afide nero del Ciliegio: tra pochi giorni avremo la presenza di questo parassita in caso di necessità programmare interventi con Sali potassici acidi grassi, detti anche saponi molli- esempio: Flipper®, o Pirimicarb aficida ad azione trans laminare, esempi: Pirimor 50 o Xintech 50 o Pediment, o Spirotetramat, esempio Movento ® 48 SC. o Delegate™ WDG.



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aiроверona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:
Ivoli—Ivagro
Viale del Lavoro, 52
37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.